

管路滑脫的處理

一、導尿管滑脫處理：

- 1、先記錄滑脫時間，將尿袋中的尿液倒掉並記錄尿量（尿布要稱重）
- 2、請補充個案水份，並鼓勵自解尿液，並觀察病患幾點解尿並記錄
- 3、若大於八小時無解尿或解 250c.c 以下或出現喘、下腹漲痛，上班時段通知 5533381 或 5533384 居家護理所人員處理，非上班請送至本所特約醫院（大安醫院）或您平時習慣就醫的醫院處理。

二、鼻胃管滑脫處理：鼻胃管滑脫時不會有立即生命危險

- 1、先注意滑脫長度，一般固定於六十公分處，若您發現只滑脫出約十公分，可試著讓個案配合吞嚥，由您來緩慢推回鼻胃管
- 2、反抽看看有無胃內容物（有胃內容物可再推入），及使用灌食空針打約 30c.c 空氣，觸摸個案腹部，以確認鼻胃管是否在正確位置
- 3、若滑脫過長，上班時段通知居家護理所人員處理，非上班請送醫院處理

三、氣切管滑脫**緊急**處理：

- 1、先使用面罩和急救球擠壓給予氧氣，氣切傷口消毒紗布覆蓋，帶著滑脫的氣切管**緊急送醫**，並請通知居家護理所人員
- 2、若無面罩和急救球，可利用無菌抽痰管，置放於氣切造口中，並維持個案呼吸道暢通，持續給予氧氣供應，**緊急送醫**